

拟除虫菊酯类杀虫剂中毒急救方法

常见的拟除虫菊酯类杀虫剂有：氯菊酯、高效氯氰菊酯、高效氯氟氰菊酯、高效氟氯氰菊酯、溴氰菊酯、顺式氯氰菊酯、联苯菊酯、氟氯氰菊酯、胺菊酯等。其制剂一般对人、畜比较安全，但如果使用不当或误食，也会引起中毒。

中毒症状：

表现为头晕、头痛、恶心、流涎、胸闷、心里发慌，心跳加快，四脚痉挛无力，有时想吐又吐不出来；皮肤沾染药水时，表现为发红、发辣、发痒、发麻等症状。

急救方法：

(1) 立即将中毒者从污染现场移至温暖而空气新鲜的地方，脱掉工作服，洗净身体接触药部分，另换干净衣服，注意不要让患者着凉。

(2) 若误食溴氰菊酯，立即用食盐水催吐、洗胃，然后口服活性炭，进一步吸收毒液。若吸入拟除虫菊酯的毒气，可用半胱氨酸衍生物雾化吸入治疗 15 分钟。

(3) 对症治疗：若眼睛受到污染，可用大量清水冲洗；皮肤受到污染刺激时，应在阴凉地方，用清水冲洗干净后，涂抹润肤膏。如果中毒严重并伴有神经症状者，可肌肉注射异戊巴比妥 1 支；若病人严重呼吸困难，应立即输氧，并采取措施保障呼吸通畅。

(4) 对有机磷农药和拟除虫菊酯混用而引起的中毒患者，应先按有机磷农药中毒处理，可先服用阿托品解毒，在紧急情况下，也可肌肉注射磺甲基吡啶乙醛肟 200~400 毫克。