

有机磷类杀虫剂中毒急救方法

用作卫生杀虫剂的有机磷类杀虫剂主要有：毒死蜱、辛硫磷、倍硫磷、乙酰甲胺磷、双硫磷、杀螟硫磷、敌敌畏、甲基吡恶磷等。

中毒症状（分为三类）：

- （1）轻度：有头晕、头痛、恶心、呕吐、多汗、无力、胃口不好、胸闷、视力模糊等。
- （2）中度：除以上症状外，还出现轻度呼吸困难、肌肉跳动、瞳孔缩小、精神恍惚、走路不稳、大汗流涎、腹痛、腹泻等。
- （3）重度：除上述症状加重外，还出现昏迷、抽搐、呼吸极度困难、口吐白沫、肺水肿、瞳孔小如针尖、大小便失禁、惊厥或呼吸麻痹等。如不及时抢救，即有生命危险。

急救方法：

- （1）立即将患者抬离中毒现场，清除毒物，阻止毒物的继续吸收。如皮肤污染时，立即用微温的肥皂水或2%碱水彻底清洗（不能用热水）。如误服中毒，应尽快催吐和洗胃。
- （2）及时服用解毒药物。有机磷解毒剂目前有两类，一类是抗胆碱剂，主要是阿托品；另一类是胆碱酯酶复能剂，主要有解磷定、氯磷定、双复磷等。
- （3）中医中药治疗：用绿豆1两，甘草1两煮水服；或用曼陀罗0.5--0.9克煎汤服用；或用金鸡尾、金银花各4两、甘草2两煮水服，一次灌服两碗。
- （4）对症治疗：呼吸困难者，要给予输氧，必要时进行人工呼吸；发生脑水肿时，应迅速让患者脱水利尿。同时服用保护脑细胞的药物以及苏醒药物，并给予输液；大量出汗、脱水严重者，要补充盐水，并注意水电平衡。